

Literatur Kapitel 15 - Psychische Erkrankungen in der AM

15.1. Begleitung psychisch Kranker durch den Hausarzt

1. Leoni T, Schwinger J. Fehlzeitenreport 2017; 2017 [Stand: 14.05.2018].
2. Amick HR, Gartlehner G, Gaynes BN, Forneris C, Asher GN, Morgan LC et al. Comparative benefits and harms of second generation antidepressants and cognitive behavioral therapies in initial treatment of major depressive disorder: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015; 351:h6019.
3. Hauptverband der öst. Sozialversicherungsträger, Salzburger Gebietskrankenkasse. Analyse der Versorgung psychisch Erkrankter: Projekt „Psychische Gesundheit“ - Abschlussbericht; 2011 [Stand: 14.05.2018].
4. Veit I, Ständige Leitlinien-Kommission der DEGAM. DEGAM-Praxisempfehlung Hausärztliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Angst [Stand: 15.05.2018].
5. ÄZQ D. S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.leitlinien.de/nvl/html/depression/>.
6. Bergert W, Braun M, Ehrenthal K, Feßler J, Gross J, Hüttner U et al. Hausärztliche Leitlinie Psychosomatische Medizin in der Hausarztpraxis; 2014 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <http://www.degam.de/degam-leitlinien-379.html>.
7. Payk TR, Brüne M. Checkliste Psychiatrie und Psychotherapie. 7., überarbeitete Auflage. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 2018. (Checklisten der aktuellen Medizin).
8. Albus C, Ladwig K-H, Herrmann-Lingen C. Psychokardiologie: praxisrelevante Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. Dtsch Med Wochenschr 2014; 139(12):596–601. doi: 10.1055/s-0033-1360102.
9. Herrmann-Lingen C, Kleiber C. Psychokardiologie I Psychokardiologische Behandlung: mental-health guide [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.mental-health-guide.com/therapie/psychokardiologie/>.
10. Hausteiner-Wiehle C, Henningsen P. S 3 Leitlinie: Umgang mit Patienten mit nichtspezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden; 2012 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-001I_S3_Nicht-spezifische_funktionelle_somatoforme_Koerperbeschwerden_2012-abgelaufen.pdf.
11. Batra A, Wassmann R, Buchkremer G, Angenendt J, Hrsg. Verhaltenstherapie: Grundlagen - Methoden - Anwendungsgebiete. 4., vollständige überarbeitete Auflage. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 2013. (Klinische Psychologie und Psychiatrie).
12. Zhang A, Park S, Sullivan JE, Jing S. The Effectiveness of Problem-Solving Therapy for Primary Care Patients' Depressive and/or Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Board Fam Med 2018; 31(1):139–50. doi: 10.3122/jabfm.2018.01.170270.
13. Pierce D. Problem solving therapy: Use and effectiveness in general practice [online]. Verfügbar unter: <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=737147217684999;res=IELHEA>.

15.2. Schlafstörungen

1. Riemann D, Baum E, Cohrs S, Crönlein T, Hajak G, Hertenstein E et al. S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. Somnologie 2017; 21(1):2–44. doi: 10.1007/s11818-016-0097-x.
2. Chung K-F, Lee C-T, Yeung W-F, Chan M-S, Chung EW-Y, Lin W-L. Sleep hygiene education as a treatment of insomnia: a systematic review and meta-analysis. Fam Pract 2017. doi: 10.1093/fampra/cmz122.
3. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Wirkstoffe mit der Indikation: Schlafstörungen [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01tsammel.php3?knr=&art=&nummer=Schlafst%F6rungen&ord=uaw>.
4. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Benzodiazepine: Schlafmittel, barbituratfreie; 2015 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=Gruppe&nummer=Benzodia zepine&ord=uaw>.
5. Buysse DJ. Insomnia. JAMA 2013; 309(7):706–16. doi: 10.1001/jama.2013.193.
6. Winkler H. Pharmainformation: Medikamentöse Therapie der Insomnien; 1998/2013 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.i-med.ac.at/pharmakologie/pharmainfo/info13-2.html>.
7. van Straten A, van der Zweerde T, Kleiboer A, Cuijpers P, Morin CM, Lancee J. Cognitive and behavioral therapies in the treatment of insomnia: A meta-analysis. Sleep Med Rev 2018; 38:3–16. doi: 10.1016/j.smrv.2017.02.001.
8. Jespersen KV, Koenig J, Jennum P, Vuust P. Music for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015; (8):CD010459. doi: 10.1002/14651858.CD010459.pub2.

9. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Zolpidemtartrat: Schlafmittel, barbituratfreie; 2018 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Zolpidemtartrat&ord=uaw>.
10. Everitt H, Baldwin DS, Stuart B, Lipinska G, Mayers A, Malizia AL et al. Antidepressants for insomnia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018; 16(10):2219. doi: 10.1002/14651858.CD010753.pub2.

15.3. Demenz

1. Erkinjuntti T, Hallikainen M. Gedächtnisstörungen, leichte kognitive Beeinträchtigung und Demenz: EbM-Guidelines; 2017 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home?q=>.
2. Erkinjuntti T, Koivu M. Reversible Ursachen von Gedächtnisstörungen: EbM-Guidelines; 2018 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home?q=>.
3. Deuschl G, Maier W, Jessen F. S3-Leitlinie „Demenzen“. Langversion; 2016 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-013L_S3-Demenzen-2016-07.pdf.
4. Erkinjuntti T, Sulkava R. Demenz bei M. Parkinson und Lewy-Body-Demenz: EbM-Guidelines; 2014 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home?q=>.
5. Rosenvall A, Erkinjuntti T. Untersuchung und Beurteilung von Gedächtnisstörungen: EbM-Guidelines; 2018 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home?q=>.
6. Remes A, Hallikainen M. Alzheimer-Demenz: EbM-Guidelines; 2017 [Stand: 16.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home?q=>.
7. Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, Trevelyan CM, Hampton T, Rayment D et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database Syst Rev 2016; (1):CD011145. doi: 10.1002/14651858.CD011145.pub2.
8. Bergert FW, Braun M, Feßler J, Hüttner U, Kluthe B, Popert U et al. Hausärztliche Leitlinie Geriatrisches Assessment in der Hausarztpraxis; 2018 [Stand: 16.05.2018].
9. Seitz DP, Chan CC, Newton HT, Gill SS, Herrmann N, Smailagic N et al. Mini-Cog for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias within a primary care setting. Cochrane Database Syst Rev 2018; 2:CD011415. doi: 10.1002/14651858.CD011415.pub2.
10. Stürzlinger H, Antony K, Eisenmann A, Pertl D. Rezente Evidenz zur medikamentösen Therapie von psychischen und Verhaltenssymptomen bei Alzheimer-Demenz: Ein systematischer Review zur Wirksamkeit im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 2016.
11. van der Steen JT, Smaling HJ, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJ, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2018; 7:CD003477. doi: 10.1002/14651858.CD003477.pub4.
12. Zhang H-F, Huang L-B, Zhong Y-B, Zhou Q-H, Wang H-L, Zheng G-Q et al. An Overview of Systematic Reviews of Ginkgo biloba Extracts for Mild Cognitive Impairment and Dementia. Front Aging Neurosci 2016; 8:276. doi: 10.3389/fnagi.2016.00276.
13. Choosing Wisely. Treating disruptive behavior in people with dementia: Antipsychotic medicines are usually not the best choice: AGS, Choosing Wisely; 2017 [Stand: 16.05.2018].
14. van Leeuwen E, Petrovic M, van Driel ML, Im Sutter A de, Vander Stichele R, Declercq T et al. Withdrawal versus continuation of long-term antipsychotic drug use for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3:CD007726. doi: 10.1002/14651858.CD007726.pub3.
15. Burckhardt M, Herke M, Wustmann T, Watzke S, Langer G, Fink A. Omega-3 fatty acids for the treatment of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4:CD009002. doi: 10.1002/14651858.CD009002.pub3.
16. Farina N, Llewellyn D, Isaac MGEKN, Tabet N. Vitamin E for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2017; 4:CD002854. doi: 10.1002/14651858.CD002854.pub5.
17. McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016; (1):CD003160. doi: 10.1002/14651858.CD003160.pub3.
18. Jongstra S, Harrison JK, Quinn TJ, Richard E. Antihypertensive withdrawal for the prevention of cognitive decline. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11:CD011971. doi: 10.1002/14651858.CD011971.pub2.
19. Pentzek M, Michel JV, Ufert M, Vollmar HC, Wilm S, Leve V. Fahrtauglichkeit bei Demenz - Theoretische Rahmung und Konzept einer Vorgehensempfehlung für die Hausarztpraxis. Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes 2015; 109(2):115-23. doi: 10.1016/j.zefq.2015.03.005.

20. Breen DA, Breen DP, Moore JW, Breen PA, O'Neill D. Driving and dementia. BMJ 2007; 334(7608):1365–9. doi: 10.1136/bmj.39233.585208.55.
21. Bauer J. Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. München, Berlin, Zürich: Piper; 2015. (Piper; Bd. 30185).

15.4. Gerontopsychiatrie

1. Holt S, Schmiedl S, Thürmann PA. Potentially inappropriate medications in the elderly: the PRISCUS list. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(31-32):543–51. doi: 10.3238/arztebl.2010.0543.
2. Klauber J, Kuhlmeier A, Schwinger A, Jacobs K, Greß S. Pflege-Report 2017, Schwerpunkt: Die Versorgung der Pflegebedürftigen. 1. Auflage. Stuttgart: Schattauer; Schattauer Verlag; 2017. (Pflege-Report; Bd. 2017). Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783794590766.
3. Talaslahti T, Saarela T. Psychotische Symptome im Alter: EbM-Guidelines; 2018 [Stand: 18.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home>.
4. Huybrechts KF, Gerhard T, Crystal S, Olsson M, Avorn J, Levin R et al. Differential risk of death in older residents in nursing homes prescribed specific antipsychotic drugs: population based cohort study. BMJ 2012; 344:e977.
5. Hausteiner-Wiehle C, Henningsen P. S 3 Leitlinie: Umgang mit Patienten mit nichtspezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden; 2012 [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-001_S3_Nicht-spezifische_funktionelle_somatoforme_Koerperbeschwerden_2012-abgelaufen.pdf.

15.5. Neuroleptika

1. Greve N, Osterfeld M, Diekmann B. Umgang mit Psychopharmaka. 3., vollst. überarb. Aufl. Bonn: BALANCE Buch + Medien-Verl.; 2011. (BALANCE Ratgeber). Verfügbar unter: <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-86739-068-2>.
2. Aderhold V. Neuroleptika minimal – warum und wie; 2014 [Stand: 18.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.dgsf.org/service/wissensportal/fachaufsaetze-als-pdf-datei/neuroleptika-minimal-warum-und-wie-2014>.
3. Aderhold V. Neuroleptika zwischen Nutzen und Schaden - minimale Anwendung von Neuroleptika. Ein Update; 2010 [Stand: 18.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.bgt-ev.de/fileadmin/Mediendatenbank/Themen/Psychopharmakadebatte/Aderhold_Neuroleptika_zwischen_Nutzen_und_Schaden.pdf.
4. Friedman RA. Antidepressants' black-box warning--10 years later. N Engl J Med 2014; 371(18):1666–8. doi: 10.1056/NEJMp1408480.
5. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Risperidon; 2017 [Stand: 18.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Risperidon&ord=uaw>.
6. © blitz-a-t. Erhöhte Sterblichkeit unter „ATYPISCHEN“ NEUROLEPTIKA BEI DEMENZ; 2005 [Stand: 18.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/2005_04/0504509_01.html.

15.6. Neuroleptisches Syndrom – Serotoninsyndrom

1. Koponen H. Malignes neuroleptisches Syndrom (MNS): EbM-Guidelines; 2018. Verfügbar unter: <https://www.ebm-guidelines.com/ebmga/home>.

15.7. Depression

1. Pan A, Sun Q, Okereke OI, Rexrode KM, Hu FB. Depression and risk of stroke morbidity and mortality: a meta-analysis and systematic review. JAMA 2011; 306(11):1241–9. doi: 10.1001/jama.2011.1282.
2. Lange-Asschenfeldt C, Lederbogen F. Antidepressive Therapie bei koronarer Herzkrankheit. Nervenarzt 2011; 82(5):657–64; quiz 665–6. doi: 10.1007/s00115-010-3181-7.
3. Claes SJ. CRH, stress, and major depression: a psychobiological interplay. Vitam Horm 2004; 69:117–50. doi: 10.1016/S0083-6729(04)69005-4.
4. Bauer J. Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. München, Berlin, Zürich: Piper; 2015. (Piper; Bd. 30185).

5. Fühlringer S, Kindler B. Arznei & Vernunft: Depressive Erkrankungen; 2006 [Stand: 19.05.2018]. Verfügbar unter: <http://www.aerztekammer.at/arznei-und-vernunft-therapieempfehlungen>.
6. Pfennig A, Bschor T, Falkai P, Bauer M. The diagnosis and treatment of bipolar disorder: recommendations from the current s3 guideline. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(6):92–100. doi: 10.3238/arztebl.2013.0092.

15.8. Antidepressiva

1. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektive; 2017 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?knr=&name1=Serotonin-Wiederaufnahmehemmer,%20selektive&nummer=Serotonin-Wiederaufnahmehemmer,%20selektive&suchstart=suchen>.
2. Kien C, Gartlehner G. Welche Antidepressiva der 2. Generation für welchen Patienten/welche Patientin? KGGK, Ökonomie & Praxis 2013; 24(1) [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.kgk.at/cdscontent/load?contentid=10008.567999&version=1391189463>.
3. ÄZQ D. S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.leitlinien.de/nvl/html/depression/>.
4. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Fluoxetin; 2017 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?knr=&name1=Serotonin-Wiederaufnahmehemmer,%20selektive&nummer=Serotonin-Wiederaufnahmehemmer,%20selektive&suchstart=suchen>.
5. Arzneimittelbrief. Behandlung älterer Patienten mit Antidepressiva – eine kritischere Beurteilung ist notwendig; 2011 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <http://www.der-arzneimittelbrief.at/at/Artikel.aspx?>
6. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, van Marter LJ, Werler MM, Louik C, Jones KL et al. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med 2006; 354(6):579–87. doi: 10.1056/NEJMoa052744.
7. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Citalopram; 2017 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Citalopram&ord=uaw>.
8. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). G09-01 - Vorbericht - Kosten-Nutzen-Bewertung von Venlafaxin, Duloxetin, Bupropion und Mirtazapin; 2012 [Stand: 21.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.iqwig.de/>.
9. Schwabe U, Paffrath D. Arzneiverordnungs-Report 2014: Aktuelle Daten, Kosten, Trends und Kommentare. Place of publication not identified: Springer Science and Business Media; 2014. Verfügbar unter: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=879177>.
10. Schwabe U, Paffrath D, Ludwig W-D, Klauber J. Arzneiverordnungs-Report 2017. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2017. Verfügbar unter: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5113054>.
11. Kochen MM. Moderne Antidepressiva sind besser verträglich als alte – ein Märchen ...: DEGAM-Benefits. Zeitschrift für Allgemeinmedizin 2012; (88 (1)):4–5.
12. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018; 391(10128):1357–66. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32802-7.
13. Gartlehner G, Hansen RA, Morgan LC, Thaler K, Lux LJ, van Noord M et al. Second-Generation Antidepressants in the Pharmacologic Treatment of Adult Depression: An Update of the 2007 Comparative Effectiveness Review. Rockville (MD); 2011.
14. Arroll B, Elley CR, Fishman T, Goodyear-Smith FA, Kenealy T, Blashki G et al. Antidepressants versus placebo for depression in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2009; (3):CD007954. doi: 10.1002/14651858.CD007954.
15. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Moclobemid; 2017 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Moclobemid&ord=uaw>.
16. © arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Duloxetin; 2017 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Duloxetin&ord=uaw>.
17. © arznei-telegramm. Nebenwirkungen: BETNÄSSEN UNTER ATYPISCHEN NEUROLEPTIKA BEI ERWACHSENEN; 2011 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=080_01&artikel=1109080_01k.
18. © arznei-telegramm. DAPOXETIN (PRILIGY) BEI VORZEITIGER EJAKULATION; 2009 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=054_01&artikel=0906054_01k.
19. © arznei-telegramm. MEDIKAMENTÖSE RAUCHERENTWÖHNUNG II; 2012 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=059_01&artikel=1207059_01k.

20. © arznei-telegramm. Nebenwirkungen: RAUCHERENTWÖHNUNGSMITTEL VARENICLIN (CHAMPIX) – ALLES GUT?; 2016 [Stand: 20.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=405_01&artikel=1605405_01.

15.9. Phasenprophylaxe

1. National Collaborating Centre for Mental Health. Bipolar disorders: NICE-Guidelines. Nat Rev Dis Primers 2018; 4:18009. doi: 10.1038/nrdp.2018.9.
2. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Lithiumsalz; 2017 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Lithiumsalz&ord=uaw>.
3. Bauer M, Adli M, Bschor T, Pilhatsch M, Pfennig A, Sasse J et al. Lithium's emerging role in the treatment of refractory major depressive episodes: augmentation of antidepressants. Neuropsychobiology 2010; 62(1):36–42. doi: 10.1159/000314308.
4. Crossley NA, Bauer M. Acceleration and augmentation of antidepressants with lithium for depressive disorders: two meta-analyses of randomized, placebo-controlled trials. J Clin Psychiatry 2007; 68(6):935–40.
5. Morlet É, Hozer F, Costemale-Lacoste J-F. Effets neuroprotecteurs du lithium : quelles implications chez l'humain atteint de troubles neurodégénératifs ? Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2018; 16(1):78–86. doi: 10.1684/pnv.20170718.
6. Chuang D-M. Neuroprotective and neurotrophic actions of the mood stabilizer lithium: can it be used to treat neurodegenerative diseases? Crit Rev Neurobiol 2004; 16(1-2):83–90.
7. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Carbamazepin; 2017 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Carbamazepin&ord=uaw>.
8. Benkert O, Hippus H. Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie (German Edition). Dordrecht: Springer; 2007. Verfügbar unter: <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=323906>.
9. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Lamotrigin; 2018 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Lamotrigin&ord=uaw>.
10. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Valproinsäure-Natrium; 2018 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Valproinsäure-Natrium&ord=uaw>.
11. © arznei-telegramm. TERATOGENITÄT VON VALPROINSÄURE (ERGENYL, GENERIKA) [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=030_01&artikel=1803030_01k.
12. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Haloperidol; 2018 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Haloperidol&ord=uaw>.
13. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Olanzapin; 2014 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Olanzapin&ord=uaw>.
14. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Aripiprazol; 2018 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Aripiprazol&ord=uaw>.
15. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Quetiapin; 2014 [Stand: 22.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Quetiapin&ord=uaw>.

15.10. Psychopharmaka-Monitoring in der Allgemeinmedizin

1. Benkert O. Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie. 11th ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016. Verfügbar unter: <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4747250>.
2. ÄZQ D. S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression [Stand: 15.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.leitlinien.de/nvl/html/depression/>.
3. Hiemke C, Bergemann N, Clement HW, Conca A, Deckert J, Domschke K et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(1-02):9–62. doi: 10.1055/s-0043-116492.

15.11. Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS)

1. Rubia K. Cognitive Neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Its Clinical Translation. Front Hum Neurosci 2018; 12:100. doi: 10.3389/fnhum.2018.00100.

2. National Collaborating Centre for Mental Health. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults: NICE Guideline, No. 87. Leicester (UK); 2018.
3. Bruchmüller K, Margraf J, Schneider S. Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria? Overdiagnosis and influence of client gender on diagnosis. *J Consult Clin Psychol* 2012; 80(1):128–38. doi: 10.1037/a0026582.
4. Merten EC, Cwik JC, Margraf J, Schneider S. Overdiagnosis of mental disorders in children and adolescents (in developed countries). *Child Adolesc Psychiatry Ment Health* 2017; 11:5. doi: 10.1186/s13034-016-0140-5.
5. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Methylphenidat-HCl; 2018 [Stand: 23.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Methylphenidat-HCl&ord=uaw>.
6. Storebø OJ, Ramstad E, Krogh HB, Nilausen TD, Skoog M, Holmskov M et al. Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Cochrane Database Syst Rev* 2015; (11):CD009885. doi: 10.1002/14651858.CD009885.pub2.
7. Storebø OJ, Pedersen N, Ramstad E, Kielsholm ML, Nielsen SS, Krogh HB et al. Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents - assessment of adverse events in non-randomised studies. *Cochrane Database Syst Rev* 2018; 5:CD012069. doi: 10.1002/14651858.CD012069.pub2.
8. © arznei-telegramm. LANGZEIT-PSYCHOSTIMULANZIEN BEI ADHS... Wachstum beeinträchtigt; 2017 [Stand: 23.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=055_03&artikel=1706055_03.
9. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Atomoxetin; 2016 [Stand: 23.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Atomoxetin&ord=uaw>.
10. © atd arznei-telegramm Arzneimitteldatenbank. Bewertung: Dexamfetaminhemisulfat; 2016 [Stand: 23.05.2018]. Verfügbar unter: <https://www.arznei-telegramm.de/db/01wkstxt.php3?&knr=&art=mono&nummer=Dexamfetaminhemisulfat&ord=uaw>.
11. Loy JH, Merry SN, Hetrick SE, Stasiak K. Atypical antipsychotics for disruptive behaviour disorders in children and youths. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; 8:CD008559. doi: 10.1002/14651858.CD008559.pub3.
12. Otasowie J, Castells X, Ehimare UP, Smith CH. Tricyclic antidepressants for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* 2014; (9):CD006997. doi: 10.1002/14651858.CD006997.pub2.
13. Tan ML, Ho JJ, Teh KH. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; 9:CD009398. doi: 10.1002/14651858.CD009398.pub3.
14. © arznei-telegramm. GUANFACIN (INTUNIV RETARD) - VOM ANTIHYPERTENSIVUM ZUM ADHS-MITTEL; 2016 [Stand: 23.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=027_01&artikel=1603027_01.

15.12. Burnout

1. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. *J. Organiz. Behav.* 1981; 2(2):99–113. doi: 10.1002/job.4030020205.