



AkdÄ Drug Safety Mail | 2022–47

16.11.2022

Information zu Spikevax[®] bivalent Auffrischungs-(Booster-)Impfstoffen: Korrekte Dosierung

Der Zulassungsinhaber informiert über Fälle versehentlicher Unterdosierungen der bivalenten Spikevax[®] Auffrischungs-(Booster-)Impfstoffe* (blaue Kappe). Meist lag eine Verwechslung der Dosis vor, da die Auffrischungsdosis für den ursprünglichen monovalenten Spikevax[®]-Impfstoff (rote Kappe) 0,25 ml (50 Mikrogramm) betrug.

- Die korrekte Dosierung für die bivalenten Spikevax[®] Auffrischungsimpfstoffe* (blaue Kappe) beträgt 0,5 ml (50 Mikrogramm).

Die bivalenten Spikevax[®] Auffrischungsimpfstoffe* werden angewendet zur aktiven Immunisierung gegen COVID-19 bei Personen ab 12 Jahren, die zuvor mindestens eine Grundimmunisierung gegen COVID-19 erhalten haben.

* Spikevax[®] bivalent Original/Omicron BA.1, Spikevax[®] bivalent Original/Omicron BA.4-5

► [Information der Firma Moderna Biotech Spain, S.L. vom 14.11.2022](#)

Bitte teilen Sie der AkdÄ beobachtete Nebenwirkungen und Medikationsfehler (auch Verdachtsfälle) mit. Die [Formulare](#) finden Sie auf der Webseite der AkdÄ.

Bundesärztekammer
Bereich Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
Herbert-Lewin-Platz 1 • 10623 Berlin

Telefon: +49 30 400456-500
Telefax: +49 30 400456-555

akdae-newsletter@baek.de • www.akdae.de

[Kontakt zur AkdÄ](#)
[Impressum](#)

[Arzneimittelsicherheit](#)
[Arzneimitteltherapie](#)
[Stellungnahmen](#)
[Die AkdÄ](#)
[Service](#)